

Polyram® DF

TIPO	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Metiram
CONCENTRACION Y FORMULACION	Microgranulado dispersable en agua que contiene 800 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.
MODO DE ACCION	POLYRAM® DF tiene una rápida acción inicial combinada con un largo poder residual. Actúa sobre todo preventivamente, es decir, es especialmente efectivo contra esporas de hongos en germinación; por lo tanto, los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza antes de que el patógeno penetre en las células de las plantas. POLYRAM® DF posee sin embargo, un efecto erradicativo hasta después de 24 horas de iniciado el proceso infectivo.
TOXICIDAD	Categoría Toxicológica IV. DL50 Oral: >5 000 mg/kg (rata) DL50 Dermal: >2 000 mg/kg (rata)
PRECAUCIONES	FRASES DE ADVERTENCIA: El producto es moderadamente tóxico para los peces: por lo tanto: "No contaminar ríos, arroyos, estanques y lagos con productos químicos de desecho o envases vacíos, o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales: En un lugar fresco con buena ventilación y en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente". "No emplear este envase para ningún otro fin. Enterrar esta funda previamente retaceada, así como los residuos del plaguicida, en una fosa diseñada para el efecto". "En caso de derrame, recoger el producto mezclándolo con tierra o aserrín y enterrarlo en una fosa" El producto es PELIGROSO en caso de inhalación e ingestión. Es irritante para los ojos y la piel. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER, BEBER o FUMAR. Evitar: La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

	Usar: Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. Antes de COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada y lavarse las partes expuestas de la piel con abundante agua.
PRIMEROS AUXILIOS	En caso de ingestión del producto provocar el vómito. No administrar grasas (aceite o leche), porque pueden acelerar la absorción. Tomar pastillas de carbón activado (carbón medicinal). Lavados gástricos deben ser realizados por un médico con agua de grifo. En caso de Inhalación apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire puro. En caso de contaminación de los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, bañarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsciencia llevar al paciente al médico y entregarle una copia de esta etiqueta.
ANTIDOTO	No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.
REGISTRO SESA REGISTRO MSP	029-F2. PE 94 0006.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS	Fungicida protectante, eficaz para combatir múltiples enfermedades foliares en varios cultivos.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS g/200 l agua	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	500	Aplicarlo al aparecer los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días.
FRÉJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Roya (<i>Uromyces phaseoli</i>)	500	Aplicarlo al aparecer los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 14 a 21 días.
LECHUGA (<i>Lactuca sativa</i>)	Mildiú (<i>Bremia lactucae</i>)	500	Aplicarlo al aparecer los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 7 a 14 días.
MANZANO (<i>Malus domestica</i>)	Sarna (<i>Venturia inaequalis</i>)	500	Aplicarlo antes y después de la floración, cada 7 a 10 días.
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>)	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	500	Aplicarlo cada 7 a 10 días después de las lluvias.
ORNAMENTALES ROSAL (<i>Rosa spp.</i>)	Mildiú (<i>Peronospora sparsa</i>)	500	Aplicarlo preventivamente cada 7 o 10 días. Mezclarlo con Kumulus para prevenir la cenicilla.
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lanchas (<i>Phytophthora infestans</i>) (<i>Alternaria solani</i>)	500	Aplicarlo al aparecer los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días.
SANDÍA (<i>Citrullus lanatus</i>)	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	500	Aplicarlo cada 7 a 10 días después de las lluvias.
TABACO (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	100	En semillero: Aplicarlo 2 veces por semana hasta el trasplante. En el campo: cada 7 días.
	Pata prieta (<i>Phytophthora nicotianae</i>)	500	
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Lanchas (<i>Phytophthora infestans</i>) (<i>Alternaria solani</i>)	500	Aplicarlo al aparecer los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 7 a 10 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Aplicar el producto cubriendo totalmente la planta. Para preparar la mezcla: Verter la cantidad necesaria de Polyram® DF directamente al tanque conteniendo agua hasta sus 3/4 partes. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar un caldo homogéneo.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y abonos foliares.
FITOTOXICIDAD	Polyram® DF no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. No se ha observado fitotoxicidad a otros cultivos.
PERIODO DE CARENCIA	Tomate = 5 días; cebolla, fréjol, lechuga, melón, sandía y tabaco = 7 días; papa = 14 días; manzano = 15 días.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	No hay restricciones una vez secado el depósito aplicado.
PRESENTACIÓN	Funda x 500 g. Funda x 1 kg. Saco x 25 kg
® Marca Registrada de BASF. Leer la etiqueta antes de usar este producto.	