

ARRASADOR 480

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Glifosato 480 g/l

Nombre Químico

Glifosato: Sal isopropil amina de n-(fosfonometil) glicina

No. CAS

Glifosato CAS: 1071 – 83-6

FORMULACION

Concentrado Soluble (SL)

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado físico: Líquido homogéneo

Color: Amarillo translúcido

Olor: Característico

Densidad (i.a.): 1.165 g/ml (20 °C)

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCION

ARRASADOR 480 es un herbicida sistémico no selectivo absorbido por el follaje con rápida translocación en toda la planta. Inactivo en contacto con el suelo. No actúa sobre semillas que se encuentran debajo de la superficie del suelo y tampoco es absorbido por las raíces. No posee acción residual prolongada y no actúa como esterilizante del suelo.

MECANISMO DE ACCION

ARRASADOR 480 tiene como ingrediente activo a Glifosato el mismo que inhibe la enzima 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate syntase (EPSPS) una enzima de la biosíntesis del ácido aromático. Previene la síntesis de aminoácidos esenciales aromáticos necesarios para la biosíntesis de las proteínas.

RECOMENDACIONES DE USO

ARRASADOR 480 se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, se mezcla fácilmente con el agua. Puede ser aplicado con la mayoría de aspersores de espalda o tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados. Puede ser aplicado en cualquier época de cultivo y cuantas veces sea necesario.

MODO DE APLICACIÓN

Llene el tanque de mezcla con la cantidad de agua necesaria y antes de terminar de llenar, agregue la cantidad de ARRASADOR 480 recomendado, agite hasta disolver.

El producto permite la utilización de volúmenes bajos entre 100 y 400 l/ha de agua son suficientes para asegurar un buen cubrimiento sin causar escurrimiento.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	RECOMENDACIONES
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Banano (Musa acuminata AAA) Piña (Anana comosus)	Cortadera	<i>Cyperus esculentus</i>	0.2 – 0.7 l/ha	Control general de la maleza
	Guarda rocío	<i>Digitaria sanguinalis</i>		
	Liendre de puerco	<i>Echinochloa colonum</i>	5 – 7 l/ha	
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>		
Arroz (Oryza sativa) Soya (Glycine max) Maiz (Zea mays) Palma africana (Elaeis guineensis) Mango (Mangifera indica L)	Arrocillo	<i>Echinochloa colonum</i>	3.0 – 4.0 l/ha	Control general de malezas o mínima labranza también en pre trasplante
	Paja mona	<i>Leptocloa filiforme</i>		
	Arroz	<i>Oryza sativa</i>		
	Caminadora	<i>Rottboella cochinchinensis</i>		
	Bledo	<i>Amaranthus hybridus</i>		
Cacao (Theobroma cacao L.) Café (Coffea arabica L) Cítrico (Citrus aurantium.) Maracuyá (Passiflora edulis Sims) Potreros Áreas no agrícolas.	Siempre viva	<i>Commelina diffusa</i>	1.0 – 2.0/200 l de agua.	Control general dirigido en aplicaciones de parcheo. Control total en caminos, canales, cercas, etc.
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	Pasto pará	<i>Brachiaria mutica</i>		
	Pasto Argentina	<i>Cynodon dactylon</i>		
	Lechosa	<i>Euphorbia heterophylla</i>		
	Pasto guinea	<i>Panicum maximum</i>		
	Gramalote	<i>Paspalum fasciculatum</i>		
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>		
Betilla	<i>Ipomea tiliácea</i>			
Escoba dulce	<i>Sida acuta</i>			

COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales como úreas sustituidas, triazinas, etc, pueden reducir su actividad.

AVISO AL COMPRADOR

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORIA TOXICOLOGICA

IV CUIDADO

PRESENTACIONES

Envases de 1 , 3.8 y 19 litros

REGISTRO

039-H66-SESA-U

TITULAR DE REGISTRO, FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC @ CUSTER