

## FULLMINA®



Dow AgroSciences

Soluciones para un Mundo en Crecimiento



El compadre del agro

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** Herbicida sistémico selectivo que se utiliza en el control de malezas de hoja ancha en cultivos de gramíneas.

**NOMBRE COMÚN:** 2,4 - D Amina.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** Líquido soluble que contiene 600 g de ingrediente activo (equivalente ácido) por litro de producto comercial.

**MODO DE ACCIÓN:** Herbicida sistémico selectivo para el control de malezas herbáceas de hoja ancha y algunas ciperáceas, actúan interfiriendo el metabolismo de los ácidos nucleicos y otros procesos fisiológicos de la planta, como la respiración, la fotosíntesis, la división celular, la generación de ATP y otros.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fertilizantes existentes en el mercado.

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica III. Ligeramente peligroso.

**PRECAUCIONES:** Se debe usar de acuerdo a las normas de protección como: Usar guantes, mascarilla, botas, etc. No FUMAR, COMER o BEBER cuando el producto se manipula o se fumiga. Evite la contaminación de fuentes de agua potable o de riego. No almacenar ni transportar con productos destinados a consumo alimenticio, evitar el acarreo hacia cultivos de hoja ancha.

**PRESENTACIONES:**

Envase x 1 litro.

Envase x 4 litros.

Envase x 20 litros.

Tanque x 200 litros.

**REGISTRO MAGAP:** 003-H-3.

**DISTRIBUIDO POR:** FARMAGRO.

### DOSIFICACIÓN DE FULLMINA®:

| CULTIVO                                          | DOSIS |                     | FRECUENCIA DE APLICACIÓN                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ha    | 200 l agua          |                                                                                                            |
| <b>ARROZ</b><br>( <i>Oryza sativa</i> )          |       | Postemergente 1.0 l | Luego de 4 - 8 semanas de la emergencia (secano) y 8 semanas arroz inundado.                               |
| <b>ARROZ</b><br>( <i>Oryza sativa</i> )          | 1.5 l | 0.75 l              | Aplicar al macollamiento completo.                                                                         |
|                                                  | 0.5 l | 0.25 l              | Aplicar con propanil entre 2 <sup>da</sup> y 3 <sup>era</sup> semana.                                      |
| <b>PASTOS</b>                                    | 3.0 l | 1.5 l               | Usar 3 l/ha para aplicación general.                                                                       |
| <b>MAÍZ</b><br>( <i>Zea mays</i> )               | 1.5 l | 1.5 l               | Aplicar en forma general al alcanzar el cultivo entre 10 y 20 cm de altura.                                |
|                                                  |       |                     | Aplicar en forma dirigida fuera de la época.                                                               |
| <b>CAÑA DE AZÚCAR</b><br>( <i>Sacharum sp.</i> ) | 2.0 l | 2.0 l               | Aplicar en mezcla con residuales antes o después que germine la caña, pero luego que germinen las malezas. |