




Yonex



YONEX, es un activador fisiológico con una doble acción, incrementa la producción y calidad de las cosechas y ayuda a incrementar la capacidad inmunológica y resistencia natural de los cultivos. El ingrediente activo de YONEX se encuentra perfectamente estable (Yodo libre) y está especialmente formulado para su uso en la agricultura al ser traslocado foliarmente o radicularmente, activa un sin número de reacciones anabólicas incrementando las proteínas de reserva y cataliza el desdoblamiento enzimático requerido para la formación de clorofila incrementando los niveles de azúcares los cuales son esenciales para obtener una mejor y mayor cosecha.

Las principales ventajas del uso de YONEX son:

- Activa la floración, fructificación y amarre de los frutos.
- Activa una mayor absorción de los nutrientes esenciales.
- Activa la capacidad inmunológica de la planta al incrementar la resistencia natural de esta.
- Incrementa el desarrollo de raíces, tallos, hojas y frutos.
- Incrementa los procesos fotosintéticos, incrementando la formación de azúcares.
- Trabaja en forma sistémica y de contacto.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL		
INGREDIENTES ACTIVOS		% en Peso
Yodo libre (Equivalente a 10 g de I.A./L)	No menos de	1.00
Surfactante	No menos de	28.00
INGREDIENTES INERTES		
Diluyentes y Acondicionadores	No más de	71.00
TOTAL		100.00


RECOMENDACIONES PARA SU USO

Se recomienda aplicar YONEX con NUTRIPLANT PLUS (5 a 10cc/L de agua) cuando se aplica en etapas vegetativas y con PEKA (10cc/L de agua) cuando se aplica posterior a la floración. Así mismo se recomiendan aplicaciones posteriores de 500 cc/Ha. de BIOFORTE más 2 L/Ha. de NUTRIPLANT PLUS en la etapa de desarrollo vegetativo y 500 cc/Ha. de BIOFORTE mas 2 L/Ha. de PEKA en floración y fructificación para que la planta tenga a su disposición todos los nutrientes necesarios para un máximo rendimiento del cultivo.

PRESENTACIONES



1 L



20 L

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO		
CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
CÍTRICOS	200 cc/100 L de agua	Aplicación al follaje con equipo de aspersión, primera aplicación en prefloración. Realizar dos aplicaciones más en crecimiento de fruto.
HORTALIZAS Invernadero y/o vivero	1 cc/m²	En almácigo aplicar foliarmente cada 7 días.
HORTALIZAS	300 a 500 cc/100 L de agua	La primera aplicación se deberá efectuar 8 días después del trasplante hasta el momento de la cosecha con un intervalo de 7 – 15 días.
FRUTALES Manzano, Durazno, Peral, Nogal, Aguacate y Mango	300 a 500 cc/100 L de agua	Aplicación al follaje con equipo de aspersión, iniciando aplicaciones en rebrote de hojas y en prefloración.
CAÑA DE AZÚCAR	500 cc/100 L de agua	Al momento de la siembra aspersión directa a los esquejes en el fondo del surco.
	300 a 500 cc/100 L de agua	Aplicación al follaje con equipo de aspersión. Primera aplicación entre 30 y 50 cms. de altura 60 días después de emergencia, la segunda aplicación antes del cierre del cañal.
ORNAMENTALES	200 a 400 cc/100 L de agua	Aplicación al follaje con equipo de aspersión cada 8 días.
ARROZ	200 a 400 cc/100 L de agua	Al momento del macollamiento y repetir 15 días después.
FRESA	200 a 400 cc/100 L de agua	Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 21 días.
BANANO	300 cc/100 L de agua	Iniciar cuando se de el desarrollo de hojas. Tratamiento complementario contra enfermedades fungosas.
PAPAYO	300 cc/100 L de agua	Iniciar en prefloración y después cada 21 días.
PIÑA	200 cc/100 L de agua	Iniciar al emerger la bellota y subsecuentes cada 28 días.