

TEMPANO

INSECTICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

RSCO-MEZC-INAC-1101H-0445-002-32.80

Titular del Registro: GOWAN MEXICANA

País: MÉXICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

IMIDACLOPRID 228 g/kg

LAMBDAHALOTRINA 100 g/kg

Ingredientes inertes 672 g/kg

GENERALIDADES

TEMPANO es un insecticida de aplicación foliar para la prevención y control de las plagas

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Brócoli Col Col de bruselas Coliflor Nabo Colza Chayote	Mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	250-350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o ninfas de mosquita blanca. Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Aplique cuando se observe los primeros síntomas de daño del gusano falso medidor sobre las plantas. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha.
Calabaza Calabacita Melón Pepino Sandía	Mosquita blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Barrenador del pepino (<i>Diaphania hyalinata</i>)	250-350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o ninfas de mosquita blanca. Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Aplique cuando se observe el primer fruto con larva viva del barrenador del fruto. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha.
Chile	Picudo del chile (<i>Anthonomus eugenii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	250-350	Aplique cuando se observen los primeros adultos y/o primer fruto con larva viva de picudo de chile y/o los primeros pulgones alados. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha.
Berenjena Jitomate Tomate de cáscara Papa	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	250-350	Aplique cuando se observen los primeros pulgones alados. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 200-250 L de agua / Ha

Aguacate	Mosquita blanca (<i>Paraleyrodes perseae</i>)	250-350	Aplice cuando se observen los primeros adultos de mosquita blanca. Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Utilizar un gasto de 800-900 L de agua / Ha.
Avena Cebada Centeno Trigo Triticale Arroz	Pulgón de la espiga (<i>Sitobion avenae</i>) Pulgón del tallo (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	100-200	Realizar una aplicación al follaje cuando se observen los primeros individuos de adultos/o ninfas de pulgón. Utilizar un gasto de 366-466 L de agua / Ha.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Antes de aplicar el producto calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Puede aplicarse con equipo terrestre, aspersora de mochila o equipo accionado por tractor.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verificar la correcta calibración del equipo antes de iniciar la aplicación. Poner agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador, agregar la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la dosis recomendada en esta etiqueta, manteniendo el agitador en marcha y completar con el resto del volumen de agua. Se recomienda agregar un coadyuvante no-iónico para mejorar el cubrimiento.

COMPATIBILIDAD: TEMPANO no debe mezclarse con ningún otro plaguicida ó químico en general. En caso de duda con respecto a la compatibilidad del producto se recomienda efectuar siempre pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos en los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe esperar 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección.

CARENCIAS: 3 días para: Brócoli, Col, Col de bruselas, Coliflor, Nabo, Colza, Chayote, Calabaza, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía; 1 día para: Chile; 15 días para: Berenjena, Jitomate, Tomate de cáscara, Papa; 7 días para: Aguacate; 30 días para: Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Arroz.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS Y UTILIZAR EN LUGARES CON ADECUADA VENTILACIÓN. Durante su manipulación, evitar el contacto con la piel y mucosas, no inhalar vapores del producto formulado ni trabajar en la neblina de pulverización. Use siempre elementos de protección adecuados: overol de manga larga, guantes de neopré, botas de goma, gafas protectoras, capuchas impermeables y máscara con filtros. Luego de su utilización, Recuerde lavarse bien las manos antes de ingerir alimento, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño, báñese con suficiente agua y jabón, cámbiese por ropa limpia, nunca lave su ropa de trabajo y su equipo de protección junto con la ropa de uso diario. El uso de este producto es exclusivamente agrícola, aplicar solo las dosis recomendadas, no pulverizar en contra del viento o con vientos superiores a los 10 km/h. No utilizar equipos con pérdida y no destapar boquillas o tuberías con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua potable por al menos 15 minutos. En caso de irritación acudir al médico.

En caso de contacto cutáneo: Retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con agua fría y jabón.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco, Solicite instrucciones médicas.

En caso de ingestión: Acudir inmediatamente a un centro asistencial. Dar a beber agua, solo si la persona está consciente.

ANTIDOTO: No se conoce antídoto específico, se recomienda realizar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua, inutilizar los envases vacíos y entregarlos al centro autorizado de acopio de envases vacíos de agroquímicos, realizar triple lavado de envases.

TEMPANO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

Importado y distribuido por:

GOWAN MEXICANA S.A.P.I de C.V.
Calz. Cetys 2799 Edif. B Local 2 y 4. Col.
Rivera C.P. 21,259 Mexicali, Baja California
Tel.: (686) 564-75- 00 / Fax: (686) 565-71-00

Titular del registro:

GOWAN MEXICANA S.A.P.I de C.V.
Calz. Cetys 2799 Edif. B Local 2 y 4. Col.
Rivera C.P. 21,259 Mexicali, Baja California
Tel.: (686) 564-75- 00 / Fax: (686) 565-71-00

USO AGRICOLA
CATEGORÍA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. COMUNIQUESE AL TELÉFONO 01 800 000 ATOX (2869)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA
ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES
DE AGUA”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador

acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el uso y manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.