

PREMIO



Insecticida agrícola
Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorantraniliprole:200 g/l
Aditivos c.s.p. 1 l

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: PREMIO pertenece al grupo de insecticidas de las diamidas antranílicas, (Grupo 28-IRAC) para este grupo de insecticidas se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo para prevenir fenómenos de resistencia. PREMIO pertenece a una clase de insecticidas con un novedoso modo de acción que actúa en los receptores de rianodina, actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que paren de alimentarse, se paralicen y mueran en un período de 1 a 3 días. Las aplicaciones deberán programarse en el momento más susceptible del insecto, típicamente huevo o larvas recién eclosionadas, antes de que las poblaciones alcancen niveles dañinos.

MODO DE EMPLEO: Vierta la cantidad de PREMIO en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{3}{4}$ o la mitad. Complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo. No guarde la mezcla en el tanque de la aspersora de un día para otro.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

⁽¹⁾ Realice 1 aplicación durante el ciclo del cultivo, cuando se observen los primeros daños por oviposición o minas en el follaje. Aplique con boquillas de cono hueco, dirigido al follaje de la planta, principalmente en épocas de verano.

⁽²⁾ Realice máximo 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, justo antes de deshierbar y justo antes del aporque o retape. La última aplicación debe realizarse al momento de la maduración completa, con productos insecticidas de un grupo químico con diferente modo de acción al de PREMIO. Aplíquese con boquilla de cono hueco dirigido al tercio inferior de la planta y la zona de las raíces alrededor del tallo asegurando un mojado completo del suelo alrededor de los tubérculos.

⁽³⁾ Realice máximo 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, justo antes del retape o aporque y al momento de la floración completa. Aplíquese con boquilla de cono hueco dirigido al tercio inferior de la planta y la zona de raíces alrededor del tallo, asegurando un mojado completo del suelo alrededor de los tubérculos.

Es esencial realizar un manejo integrado de la plaga que incluya rotación de cultivos, recolección de residuos de cosecha, deshierba y aporques o retapes profundos, y riegos donde sea factible utilizarlo.

⁽⁴⁾ Aplíquese con boquilla de cono hueco dirigida al follaje, cuando aparezcan los primeros síntomas de la plaga en campo. Deben realizarse máximo 3 aplicaciones por ciclo de cultivo con un intervalo de 10 días entre estas, o siete en caso de alta infestación.

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS CULTIVOS: Si se requieren otras aplicaciones químicas, realícelas con productos insecticidas de un grupo con diferente MODO DE ACCIÓN al de PREMIO. Es esencial realizar un manejo integrado de las plagas que incluya rotación de cultivos, recolección de residuos de cosecha, deshierba, aporques o atirradadas profundas y riegos donde sea factible utilizarlo.

PERÍODO DE REINGRESO: Ingrese al área tratada 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El insecticida no es fitotóxico a los cultivos agrícolas que se especifican en esta etiqueta, siempre y cuando se sigan todas las indicaciones referentes a dosificación, equipo de

aplicación, época de aplicación y demás precisiones señaladas en la sección "instrucciones de uso y manejo".

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una premezcla con una pequeña cantidad de producto en el tanque deseado y observar los posibles cambios adversos (precipitación, floculación, etc.), así como demostrar la eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos. La mezcla deberá hacerse únicamente con los plaguicidas registrados para uso en los cultivos aquí indicados. Evite mezclar varios materiales a la vez y caldos de aspersión muy concentrados.

Responsabilidad: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III. Ligeramente Peligroso. LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Evite aspirar (polvo, vapor o aspersión). Puede causar irritación ocular temporal con lagrimeo o visión borrosa. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección, y careta), y para ingresar al área tratada. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado alejado del sitio de contaminación y cerciórese de que respira sin dificultad. Consulte un médico si es necesario.

En caso de contacto con la piel: Retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte un médico si es necesario.

En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte un médico si es necesario.

En caso de ingestión: No induzca el vómito. Consulte un médico si es necesario.

Antídoto: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta."

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. DuPont de Ecuador Tel. 02-250-8751 Ex t.114

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para conservar alimentos y agua para consumo. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Es tóxico para algunos organismos acuáticos invertebrados. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre

de la aspersión desde las áreas tratadas.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 1 litro

REGISTRO NACIONAL NO.: 139-I 1/NA - CL1

DISTRIBUIDO POR: FARMAGRO.

DOSIFICACIÓN DE PREMIO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ml/ha	PC (PERIODO DE CARENCIA)
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Minador de hojas (<i>Liriomiza huidobrensis</i>) ⁽¹⁾	150	14 (días)
	Gusano blanco (<i>Premnotypes vorax</i>) ⁽²⁾	300	30 (días)
	Polilla Guatemalteca (<i>Tecia solanivora</i>) ⁽³⁾	250	30 (días)
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Gusano enrollador (<i>Tuta absoluta</i>) ⁽⁴⁾	150	3 (días)