

RUGBY® 10G



Cadusafos
Insecticida-nematicida agrícola
Granulado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Porcentaje en peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Cadusafos: 0-etil S,S-di-sec- butil fosforoditioato
 No menos de: 10.00
 (Equivalente a 100 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Diluyente, acondicionador y compuestos relaciona-
 dos

No más de: 90.00

Total: 100.00

PRECAUCION: RUGBY® 10 G es un producto ligeramente tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo de este producto. Evite el contacto con la piel y ojos.

Evite la inhalación del producto. No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

LIGERAMENTE TÓXICO.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación.

RUGBY® 10 G es un insecticida nematicida organofosforado que actúa por contacto e ingestión. No es absorbido por la planta, por lo que **RUGBY® 10 G** tiene efecto solamente contra plagas de la raíz.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: RUGBY® 10 G es un producto que viene listo para usarse. Abra el saco en la parte superior y vacíe el producto en la tolva o depósito del equipo de aplicación para granúlos.

CONTRAINDICACIONES: Aplíquese solo o en mezcla con el fertilizante, procure que la semilla no quede en contacto con el producto.

Aplicar el producto cuando existan buenas condiciones de humedad.

No aplicar en plantaciones mayores de 5 años en el cultivo de agave.

FITOTOXICIDAD: RUGBY® 10 G no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD: RUGBY® 10 G no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

Cuando se desee hacer una mezcla, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad, si se realizan mezclas, éstas sólo deben hacerse con productos registrados en los cultivos aquí autorizados.

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas e impermeables y botas. No fume, tome o ingiera alimentos durante la manipulación de este producto.

Durante la aplicación, hágala a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS: Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- **Si el producto fue ingerido:** y la persona está consciente dé 1 a 2 vasos de agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico. Si la persona está inconsciente no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada.
 - **Si se adsorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

- **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
- 3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca-nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

RECOMENDACIONES PARA EL MEDICO: RUGBY® 10 G pertenece al grupo químico de los organofosforados: Los organofosforados son inhibidores irreversibles de la colinesterasa.

Signos y síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, mareo, debilidad, exceso de saliva, sudor, moco bronquial, contracciones musculares, temblores, náuseas, dolores abdominales, pupila puntiforme, visión borrosa y dificultad para respirar.

La pérdida del conocimiento, defecación, micción involuntaria y convulsiones indican envenenamiento muy severo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Suministrar sulfato de atropina de 2 a 4 mg por vía intravenosa o el equivalente a pastillas por vía oral hasta completa atropinización. También pueden usar PAM lentamente vía intravenosa 1 g para los adultos y 0.25 para los niños para completar la acción de la atropina. No se administre atropina a personas cianóticas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Proteja la vida silvestre, este producto es tóxico a peces y abejas. Durante el manejo del producto, no contamine el aire, suelo, ríos lagos, presas

o depósitos de agua, en caso de derrames (usar equipo de protección personal) recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Guárdese bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado. No almacenar en casa habitación.

GARANTÍA: FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de este producto por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

PRESENTACIONES:

Envase x 1 kg.

Envase x 15 kg.

REGISTRO: 13NI2

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FMC.

INSTRUCCIONES DE USO DE RUGBY® 10 G:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS/ha	OBSERVACIONES
PALMA	Barrenador de la raíz (<i>Sagallassa valida</i>)	50-70 g/pl	Realizar la aplicación alrededor de la planta formando un círculo de 10 cm de radio tomando como centro la base de la planta. Incorporar el producto de 5-8 cm de profundidad y cubrirlo posteriormente con el suelo. La dosificación en gramos es considerando una densidad de plantación de 143 plantas/ha. Realizar 2 aplicaciones, la primera al inicio del temporal y la siguiente 45 días después de la primera aplicación.
BANANO	Nemátodo barrenador de la raíz del banano (<i>Radopholus similis</i>)	25-30 g/cepa	Se recomienda hacer aplicaciones semestrales.
ORNAMENTALES	Nemátodo agallador (<i>Meloidogyne incognita</i>)	10 - 15 g/m²	Protección adicional contra Sinfilidos. Aplicar a 10 cm de profundidad

Tiempo de reentrada: 3 días.

() Intervalo de seguridad en días.