

DOBLE

FERTILIZANTE FOLIAR EN SUSPENSIÓN

Es una suspensión bien balanceada en NPK y con una entrega completa de micronutrientes para crecimiento y calidad de todo tipo de cultivos

DESCRIPCIÓN

WUXAL Doble es un fertilizante altamente concentrado y balanceado en NPK para aplicación foliar, para prevenir y controlar deficiencias agudas o generales en todo tipo de cultivos.

WUXAL Doble posee una composición balanceada en toda su composición, logrando una nutrición completa en varias situaciones del cultivo, inclusive situaciones de estrés fisiológico; en este último caso se logran los mejores resultados aplicando en combinación con WUXAL Amino o WUXAL Ascofol.

Optimizando la nutrición, WUXAL Doble tiene un efecto de estabilización en la sanidad del cultivo.

BENEFICIOS CLAVE

- logra un excelente balance de micronutrientes, altamente concentrados para cumplir con las demandas de todos los cultivos, especialmente en los momentos de mayor crecimiento
- el agregado de micronutrientes es adecuado, haciéndolo un producto muy completo
- asegura un excelente ingreso de los nutrientes
- adecuado para aplicar en todos los cultivos y en todas las zonas climáticas
- logra un efecto búfer (regulación de pH) en la solución
- gran adhesividad y dispersión en las hojas
- micronutrientes totalmente quelatados con EDTA
- se puede aplicar en cualquier condición de clima, debido a la adhesividad que se logra en la hoja
- compatible con la mayoría de fitosanitarios comúnmente utilizados

CONTENIDO

Suspensión NPK (24-24-18) con micronutrientes. Para fertilización foliar.

Macroelementos		g/lit
N	Nitrógeno	240
P ₂ O ₅	Fósforo	240
K ₂ O	Potasio	180
S	Azufre	15
Microelementos		mg/lit
B	Boro	300
Cu	Cobre	750
Fe	Hierro	1500
Mn	Manganeso	750
Mo	Molibdeno	15
Zn	Zinc	750

Todos los nutrientes son solubles en agua y los micronutrientes catiónicos (Fe, Cu, Mn and Zn) están quelatados con EDTA.

Además contiene fitohormonas y vitaminas.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Density: 1,5 g/cm³

pH: 6,5

Color: verde

DOBLE

FERTILIZANTE FOLIAR EN SUSPENSIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS EXTENSIVOS

Cultivo	Dosis		Observaciones
	cc/100 lt*	lt/ha	
Cereales/Colza	1 – 2 lt/ha		Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo.
No se requiere coadyuvante en caldos inferiores a 100 litros por hectárea			

CULTIVOS INTENSIVOS

Cultivo	Dosis		Observaciones
	cc/100 lt*	lt/ha	
Plantas Ornamentales	50 100	0,5 1	Plántulas y plantas jóvenes susceptibles como <i>Adiantum</i> , <i>Gloxinia</i> etc. Otras especies ornamentales.
Hortalizas en general	100 100 – 200	1 1 – 2	En invernáculos. En el campo: efectuar un mínimo de 3 tratamientos.
Papa, Tomate	200 – 400	2 – 4	Aplicar con cada tratamiento fungicida.
Frutales, Olivos, Viñedos	150 – 300	1,5 – 3	Aplicar conjuntamente con los tratamientos fungicidas después de la floración, toda vez que sea necesaria una estimulación del vigor y crecimiento de las plantas.
Citrus	150 – 250	1,5 – 2,5	Efectuar el primer tratamiento en invierno previo a la aparición de las yemas florales. El segundo tratamiento en yemas florales. Tercer tratamiento a caída de pétalos. Cuarto, quinto y sexto tratamiento a intervalos de 5 semanas.
Arándanos	100 – 200	1 – 2	Aplicar en vivero durante el crecimiento vegetativo para vigorizar la planta.
Cereales		1 – 3	Aplicar conjuntamente con tratamiento herbicida.
Viveros Forestales	25 50 100		Propagación bajo nebulización. Aplicar 2 – 3 veces por semana. Almácigos. Trasplantes.
Forestales		1 – 2	Aplicar en primavera y otoño junto con WUXAL Ascofol para estimular el crecimiento y promover la sanidad. Tratar desde el trasplante hasta el cambio de hoja.
Cebolla	200	2	Realizar dos aplicaciones para favorecer el desarrollo vegetativo.

* La concentración cada 100 litros está calculada para un gasto de caldo de 1000 lt/ha.

PRECAUCIONES

Temperaturas por debajo de 5°C y arriba de 40°C como también frecuentes fluctuaciones de temperatura durante el transporte y almacenamiento deben ser evitadas. Temperaturas muy bajas podrían causar cristalización. Estos cristales son totalmente solubles en agua y serán disueltos en el agua del tanque. Almacenamiento prolongado podría causar cambios en el color del producto. Ni la cristalización ni el cambio de color cambian ni afectan la acción fisiológica ni la calidad del producto de ninguna manera. Cuando se va a mezclar con otros productos por primera vez, siempre hacer una pre-mezcla en pequeña escala antes de uso extensivo.

® = Marca Registrada